

نشرة معلومات المرأة ومرض الزّهري

مرض الزّهري هو عدوٍ خطيرٍ تصاب بها النساء في أستراليا بشكل متزايد. تعلمي أكثر عن مرض الزّهري وكيفية حماية نفسك منه.

مرض الزّهري هو عدوٍ منقولة جنسياً (STI) تنتقل من شخص إلى آخر أثناء ممارسة الجنس.



تختلف أعراض مرض الزّهري من شخص إلى آخر

إذا أصبت بمرض الزّهري، فالعلامات الأولى هي تقرحات تظهر على الأعضاء التناسلية والشرج والفم.

مع مرور الوقت تظهر أعراض أخرى:

- طفح جلديّة
- آفات جلديّة
- تورم الغدد اللمفاويّة
- سقوط الشعر
- أوجاع العضلات والمفاصل
- صداع
- إرهاق

دون علاج، قد يتسبب الزّهري بما يلي:



- التهابات الدماغ
- الخرف
- فشل الرئتين والقلب
- العمى
- الموت

المزيد من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 يصبن به حالياً.

بين عامي 2016 و 2022، تزايدت معدلات الإصابة بعدوى الزّهري لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 بنسبة 158 بالمئة في أستراليا.*



قد لا تعلمين بأنك مصابة بمرض الزّهري

قد لا يشعر بعض الأشخاص بالمرض أو يعلمون بأنهم مصابون بالزّهري. فمن الممكن أن يكون الشخص مصاباً بمرض الزّهري وأن ينقله لشريكه دون أن يعرف.

ننصح بأن تقومي أنت وشريكك الجنسي بإجراء فحص كامل للأمراض المنقولة جنسياً بانتظام - حتى لو لم يظهر لديكما أي أعراض.



إذا اكتشفت أنك مصابة بمرض الزّهري، أخبري شريكك كي يقوم بإجراء الفحص وتلقي العلاج. وهذا سيمعن مرض الزّهري من الانتقال إليك ثانيةً أو لآخرين.

*Australian Department of Health and Aged Care, (2023), National Notifiable Disease Surveillance System. Available at <https://nindss.health.gov.au/pbi-dashboard>

المرأة ومرض الزُّهري

العلاج سهل



علاج مرض الزُّهري سهل. دواء (عادة على شكل حقن) يخلص من العدوى وهو آمن لك ولطفلك. ستحتاجين إلى إجراء فحوصات الدم بعد تلقي العلاج للتأكد من أنه قد نجح.

يمكن لطبيبك أو أخصائي الصحة الجنسية الخاص بك أن يقوم بعلاجك ومراقبة حالتك.

كيفية الوقاية من مرض الزُّهري



أفضل طريقة للوقاية من مرض الزُّهري هي الممارسة الآمنة للجنس:

- . استخدام الواقي الذكري دائمًا مع شريك جنسي جديد ومزيلق آمن للاستخدام مع الواقي الذكري (مثلاً: مزيلق ذو أساس مائي أو من أو السيليكون).
- . إجراء فحوصات للأمراض المنقولة جنسياً بانتظام والتي تشمل مرض الزُّهري.
- . يجب على الشريك الجنسي أيضًا إجراء فحص (وتلقي العلاج) بانتظام لمنع نقل مرض الزُّهري لك ثانية أو لآخرين.

إذا كنت لا تشعرين بالراحة بشأن الاتصال بالشريك الجنسي بنفسك، يمكنك زيارة www.letthemknow.org.au لتلقي النصيحة أو تكلمي مع طبيبك العام أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.



امسحي رمز الاستجابة
السريعة لمزيد من
المعلومات حول
مرض الزُّهري

| نقل مرض الزُّهري لطفلك قد يكون مميتاً

إذا كنت مصابة بمرض الزُّهري وأنت حامل،
فيمكنك نقل العدوى إلى طفلك قبل ولادته.

يُعرف هذا بمرض الزُّهري الخلقي وقد يتسبب
بما يلي:

- إسقاط الجنين
- ولادة مولود ميت
- ولادة مبكرة
- نقص في وزن الوليد عن الولادة
- موت الطفل بعد فترة قصيرة من الولادة

قد يتسبب مرض الزُّهري الخلقي بتلف دائم في دماغ طفلك أو أعضائه، وهذا يمكن أن يؤثر على نموه وتطوره.

قد لا تظهر مشاكل النمو والتطور لدى بعض الأطفال إلى أن يكبروا مما يؤدي إلى تشخيص متاخر.



إجراء فحص بانتظام يمكن أن يساعدك
بنصح بإجراء فحص كامل وبانتظام للأمراض المنقولة
جنسياً - حتى لو لم يكن لديك أي أعراض وبالخصوص إذا
كنت حاملاً أو تخططين للحمل.
فحوصات الزُّهري هي فحوصات روتينية مهمة أثناء
الحمل.

سيتم فحشك مرتين على الأقل أثناء حملك للوقاية من
الزُّهري الخلقي، وذلك بسبب تزايد مرض الزُّهري في
المجتمع. وقد يتم أيضاً إجراء فحص آخر للزُّهري إذا
كان لديك احتمال أكبر للإصابة به.

قومي بزيارة طبيبك أو قابليتك أو خدمة الأمومة الخاصة
بك لإجراء فحص كامل للأمراض المنقولة جنسياً يشمل
فحص مرض الزُّهري.